

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2012-144448

(P2012-144448A)

(43) 公開日 平成24年8月2日(2012.8.2)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
C07C 231/02 (2006.01)	C07C 231/02	4G169
B01J 31/02 (2006.01)	B01J 31/02	Z 4H006
C07C 237/06 (2006.01)	C07C 237/06	

審査請求 未請求 請求項の数 2 O L (全 8 頁)

(21) 出願番号	特願2011-1809 (P2011-1809)	(71) 出願人	505374783 独立行政法人日本原子力研究開発機構 茨城県那珂郡東海村村松4番地49
(22) 出願日	平成23年1月7日 (2011.1.7)	(71) 出願人	504203572 国立大学法人茨城大学 茨城県水戸市文京2丁目1番1号
		(74) 代理人	100140109 弁理士 小野 新次郎
		(74) 代理人	100075270 弁理士 小林 泰
		(74) 代理人	100080137 弁理士 千葉 昭男
		(74) 代理人	100096013 弁理士 富田 博行


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 メチルイミノビスジアルキルアセトアミドの製造方法

(57) 【要約】

【解決課題】 高レベル放射性廃液からのPd、Tc、Pd、Mo、Puを抽出するための抽出剤として用いることができるメチルイミノ-N,N-ジアルキルアセトアミドを安全かつ効率的に製造することができる方法を提供する。

【解決手段】 メチルイミノ2酢酸とメチルイミダゾールとを脱水ジクロロメタン中で混合し、氷温下でp-トルエンスルホンクロライドを添加して、メチルイミノ2酢酸のイミダゾール化合物を中間体として得て、当該中間体に2級アミンを添加して、下記一般式(I)：



(式中、Rは炭素数が2個～12個のアルキル基を示す)で表されるメチルイミノ-N,N-ジアルキルアセトアミドを得る。

【選択図】 なし

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

メチルイミノ 2 酢酸とメチルイミダゾールとを脱水ジクロロメタン中で混合し、氷温下で p - トルエンシルホニルクロライドを添加して、メチルイミノ 2 酢酸のイミダゾール化合物を中間体として得て、当該中間体に 2 級アミンを添加する、下記一般式 (I) :

【化 1】



(式中、 R は炭素数が 2 個 ~ 1 2 個のアルキル基を示す)

で表されるメチルイミノ - N , N - ジアルキルアセトアミドの製造方法。

10

【請求項 2】

2 級アミンは、ジエチルアミン、ジプロピルアミン、ジオクチルアミン、ジブチルアミン、ジヘキシルアミン、ジドデシルアミンから選択される、請求項 1 に記載の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、メチルイミノビスジアルキルアセトアミドの製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

原子力分野で発生する高レベル放射性廃液中には、 P d、T c、M o、P u などの金属類が含まれている。T c は、長半減期で中間貯蔵後の高レベル放射性廃液中で強い放射能を出し続けるので、長期にわたる潜在的な危険性がある。M o は、ガラス固化体の強度を下げる金属であり、ガラス固化体中の濃度が制限される元素である。P u は、使用済み燃料中に大量に含まれ、高速増殖炉では燃料として利用することのできる元素である。したがって、これらの金属は高レベル放射性廃液中から分離回収し、その他の元素と別の処理をする必要がある。

20

【0003】

しかし、これらの金属類は水溶液中において T c O₄⁻、M o O₄⁻ などの陰イオンとして存在するため、通常の抽出剤 (例えば Aliquat336、テトラフェニルアルソニウム塩等) では抽出しにくい。T c の抽出法については種々提案されている (非特許文献 1 及び 2) が、分配比が低く、被抽出金属に伴って抽出されてしまうなど、いまだ不十分である。また、高レベル放射性廃液中の P d は、溶媒抽出系において有機相に分配されるが、この有機相は金属濃度が高くなると希釈剤から主としてなる軽い相と金属が濃縮された重い相 (第三相という) が生成し、プロセス運転時にラインの目詰まり等の問題を起す場合がある。C r、W、R e は高レベル放射性廃液中における存在量は少ないが、水溶液中でオキソ酸 (C r₂O₇²⁻、W O₄²⁻、R e O₄⁻) として存在し、一般的に分離することが困難である。さらに、高レベル放射性廃液は硝酸水溶液であり、溶媒抽出に用いる有機溶剤として毒性が低く安定なドデカンが好適であるが、従来の抽出剤はドデカン中では使用することができない。

30


【0004】

本発明者らは、上記課題を解決する抽出剤として、下記一般式 :

40

【0005】

【化 1】



【0006】

(式中、 R は炭素数が 8 個 ~ 1 2 個のアルキル基を示す)

で表されるメチルイミノビスジアルキルアセトアミドを用いることを提案し (特許文献 1)、T c、R e、P d などに対して高い抽出能を有することを報告した (非特許文献 3 及び 4)

50

メチルイミノビスジアルキルアセトアミドは、3-メチルイミノ二酢酸を塩化チオニルやジシクロヘキシルカルボジイミドなどの縮合剤を用いて、酸塩化物を生成し、その後、トリエチルアミンなどの存在下でジメチルアミンやジ-n-オクチルアミンなどの二級アミン化合物を氷点下で冷却しながら添加して緩やかに反応させ、得られた生成物を水、水酸化ナトリウム及び塩酸溶液で洗浄し、シリカゲルカラムに繰り返し通して単離精製することで製造することができることが知られている。しかし、塩化チオニルは刺激臭を有するため、頻繁かつ大量に用いることには適してない。また、従来の製造法では、加熱を必要とし、メチルイミノビスジアルキルアセトアミドの収率が20%と低かった。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0007】

【特許文献1】特開2010-101641号公報

【非特許文献】

【0008】

【非特許文献1】N. Condamines, C. Musikas and L.H. Delmau, CEA-CON--11456 (1993)

【非特許文献2】M. Takeuchi, S. Tanaka, M. Yamawaki, Radiochim. Acta 63 (1993) 97-100

【非特許文献3】Y. Sasaki, Y. Kitatsuji, T. Kimura, Chem. Lett. 36, 1394-1395 (2007)

【非特許文献4】Y. SASAKI, M. OZAWA, T. KIMURA, K. OHASHI, Solv. Extr. Ion Exch., 27, 378-394 (2009)

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

本発明は、メチルイミノ-N, N-ジアルキルアセトアミドの製造方法を提供することを目的とする。本発明の製造方法によれば、特に高レベル放射性廃液からのPd、Tc、Mo、Puを抽出するための抽出剤として用いることができるアルキル基がオクチル基、デシル基、ドデシル基であるメチルイミノ-N, N-ジアルキルアセトアミドを安全かつ効率的に製造することができる方法を提供することが可能となる。

【課題を解決するための手段】

【0010】

本発明によれば、メチルイミノ二酢酸とメチルイミダゾールとを脱水ジクロロメタン中で混合し、氷温下でp-トルエンスルホニルクロライドを添加して、メチルイミノ二酢酸のイミダゾール化合物を中間体として得て、当該中間体に二級アミンを添加する、下記一般式(I)：

【0011】

【化2】



【0012】

(式中、Rは炭素数が2個～12個のアルキル基を示す)

で表されるメチルイミノ-N, N-ジアルキルアセトアミド(以下「MIDAA」と称す)の製造方法が提供される。

【0013】

本発明における合成スキームは以下のとおりである。

【0014】


10

20

30

40

【化 3】



メチルイミダゾール(NMI)

【0015】

本発明の製造方法において用いられる2級アミンとしては、ジエチルアミン、ジプロピルアミン、ジオクチルアミン、ジブチルアミン、ジヘキシルアミン、ジドデシルアミンを好適に挙げることができる。ジエチルアミンを用いる場合にはメチルイミノ-N,N-ジエチルアセトアミド(MIDEA)、ジプロピルアミンを用いる場合にはメチルイミノ-N,N-ジプロピルアセトアミド(MIDPA)、ジオクチルアミンを用いる場合にはメチルイミノ-N,N-ジオクチルアセトアミド(MIDO A)を合成することができる。MIDEA及びMIDPAは水によく溶解し、MIDO Aは疎水性が高くドデカンなどの無極性溶媒に溶解する。

【0016】

本発明の製造方法において用いられる試薬の比率は、メチルイミノ2酢酸100質量部に対して、メチルイミダゾール600質量部以上800質量部以下、p-トルエンスルホンクロライド240質量部以上320質量部以下が好ましい。試薬の使用量を上記範囲とすることで、高い収率でMIDO Aを合成することができるが、試薬の使用量が多すぎても収率を向上させることはできず、メチルイミダゾール600質量部及びp-トルエンスルホンクロライド240質量部の組み合わせが最適で10~40g(収率70%)のMIDO Aを合成することができる。

【0017】

合成されたMIDO A化合物は、酢酸エチル抽出法、減圧蒸留法、カラム分離法などの精製法を適宜組み合わせることで精製することができる。

【発明の効果】

【0018】

本発明によれば、以下の効果が得られる。

(1) 塩化チオニルを用いる従来法では、収率が20%程度であったが、本発明では70%程度と高い収率でMIDO A化合物を製造することができる。

(2) 従来法で用いる塩化チオニルは揮発性のある液体で、刺激臭を持ち、合成スケールアップのための大量使用には不適であった。本発明では、塩化チオニルを用いないため、これらの問題を解決できる。

(3) 従来法では、塩化チオニルとメチルイミノ2酢酸を加熱しながら反応させるが、本法では氷温下で反応させるため、より安全に作業することができる。

【図面の簡単な説明】

【0019】

【図1】図1は実施例1の¹H-NMRスペクトルである。

【図2】図2は実施例2の¹H-NMRスペクトルである。

【図3】図3は実施例3の¹H-NMRスペクトルである。

【実施例】

【0020】

以下、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるもので

はない。


【実施例 1】

メチルイミノ 2 酢酸 (RCOOH, 15 g) とメチルイミダゾール (NMI, 50 ml) を脱水ジクロロメタン中 (40 ml) で混合、攪拌する。氷温下で p-トルエンスルホンクロライド (TsCl, 46 g) を加えて脱水ジクロロメタン中 (240 ml) で 1 時間攪拌し、メチルイミノ 2 酢酸のイミダゾール化合物を生成した。得られたメチルイミノ 2 酢酸のイミダゾール化合物に、ジエチルアミン (25 ml) を加えて 1 昼夜攪拌した。得られた化合物を精製し、酢酸エチルで抽出した後に、減圧蒸留を行い、目的物を含む粗生成物を得た後、さらにシリカゲルカラムクロマトグラフにかけて、純粋な MIDEA を得た。¹H-NMR 分析より、メチルイミノ-N,N-ジエチルアセトアミド (MIDEA) であることを確認した (図 1)。

10

【0021】

【化 4】



20

(1) MIDEA

【0022】

収率は 70% であった。


【実施例 2】

ジエチルアミンをジプロピルアミンに変えた以外は、実施例 1 と同様に行い、メチルイミノ-N,N-ジプロピルアセトアミド (MIDPA) を合成した。各試薬の使用量は、第二級アミンの種類を変えても実施例 1 と同様とした。精製後、得られた化合物の¹H-NMR 分析より、メチルイミノ-N,N-ジプロピルアセトアミド (MIDPA) であることを確認した (図 2)。

30

【0023】

【化 5】



40

(2) MIDPA

【0024】

収率は 65% であった。


【実施例 3】

50

ジエチルアミンをジオクチルアミンに変えた以外は、実施例 1 と同様に行い、メチルイミノ - N , N - ジオクチルアセトアミド (M I D O A) を合成した。各試薬の使用量は、第二級アミンの種類を変えても実施例 1 と同様とした。精製後、得られた化合物の $^1\text{H-NMR}$ 分析より、メチルイミノ - N , N - ジオクチルアセトアミド (M I D O A) であることを確認した (図 3)。

【 0 0 2 5 】

【 化 6 】



10

(3) MIDA

20

【 0 0 2 6 】


収率は 7 1 % であった。

【 産業上の利用可能性 】


【 0 0 2 7 】

より安全に効率よく合成することができ、低コストで、Tcの抽出剤として有望なMIDA化合物を供給できる。


【 1 】



【 2 】



【 3 】



フロントページの続き

(74)代理人 100112634

弁理士 松山 美奈子

(72)発明者 佐々木 祐二

茨城県那珂郡東海村白方白根 2 番地 4 独立行政法人日本原子力研究開発機構 東海研究開発センター 原子力科学研究所内

(72)発明者 折山 剛

茨城県水戸市文京二丁目 1 番 1 号 国立大学法人茨城大学 理学部内

(72)発明者 大橋 朗

茨城県水戸市文京二丁目 1 番 1 号 国立大学法人茨城大学 理学部内

F ターム(参考) 4G169 AA02 BA21A BA21B BD12A BD12B BE22A BE22B BE33A BE33B BE37A

BE37B CB25 CB62 CB72 CB77

4H006 AA02 AC53 BB12 BU32 BV22